

LAUDO

SWAB NASOFARINGE ANTÍGENO

NOME: *Jose Valdir da Silva*
DATA DE NASCIMENTO:
SEXO: *M*
DATA SINTOMAS: *Assintomatico*
DATA COLETA: *12/03/2022.*

EXAME: **COVID AG**

MATERIAL: SECREÇÃO DE NASOFARINGE

MÉTODO: IMUNOENSAIO DE FLUXO LATERAL

RESULTADO: *Positivo.*

Wendy Carla Ferreira Lima
COREN/CE 359355-ENF-IS

ENFERMEIRO OU TÉCNICO RESPONSÁVEL




ATUALIZAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO TEMPO DE ISOLAMENTO PARA CASOS DE COVID-19

Brasília, 10 de janeiro de 2022




- CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
- DEFINIÇÕES OPERACIONAIS
- NOTIFICAÇÃO E REGISTRO
- MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
- INVESTIGAÇÃO E ISOLAMENTO DE CASOS SUPEITOS E CONFIRMADOS DE COVID-19 E QUARENTENA DE CONTATOS
 - **ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE CASOS DE COVID-19**
- RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS DE CASOS DE COVID-19
- INVESTIGAÇÃO LABORATORIAL DO CORONAVÍRUS





O **isolamento** é a separação de indivíduos infectados dos não infectados durante o período de transmissibilidade da doença, quando é possível transmitir o patógeno em condições de infectar outra pessoa.



MINISTÉRIO DA
SAÚDE



PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

gov.br/**saude**



minsaude

RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE CASOS POR COVID-19

CDC/EUA



Center of Disease Control (CDC)¹ – Estados Unidos

- Possibilidade de terminar o isolamento após **5 dias completos** a contar do início dos sintomas se sem febre durante 24 horas e sem o uso de medicamentos antitérmicos e os seus outros sintomas tiverem melhorado.
- Não obrigatoriedade da testagem para término do isolamento. No caso de acesso ao teste, recomenda-se a realização de teste rápido de antígeno (TR-Ag) e coleta no **5º dia completo**. Caso o teste der negativo, pode terminar o isolamento. Caso o teste seja positivo, deverá continuar o isolamento até ao **10º dia**.

Deve manter as seguintes medidas adicionais durante os 5 dias adicionais (6º ao 10º dia):

- Usar máscara bem ajustada ao rosto em casa ou em público.
- Evitar contato com pessoas imunocomprometidas ou com fatores de risco para agravamento da covid-19, como também locais com aglomerações de pessoas.
- Não frequentar locais onde não possa usar máscara durante todo o tempo, como restaurantes e bares; e que evitar comer próximas a outras pessoas, tanto em casa como no trabalho.
- Não viajar durante o seu período de isolamento de 05 dias após o início dos sintomas. Após esse período, orienta-se fazer teste para detecção do vírus SARS-CoV-2, preferencialmente teste rápido de antígeno, e só viajar se o resultado for negativo e que esteja sem sintomas antes da viagem. Caso não for possível realizar o teste, orienta-se adiar a viagem por pelo menos **10 dias** a contar do início dos sintomas.

¹ <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/quarantine-isolation.html>



MINISTÉRIO DA SAÚDE





National Health Service (NHS)² – Inglaterra

- Tempo de autoisolamento **10 dias** a contar do início dos sintomas.
- É possível encerrar o auto-isolamento após **7 dias** do início dos sintomas, após realização de TR-Ag e resultado negativo.

Nesse caso, deve-se adotar as seguintes medidas até o 10º dia:

- Trabalhar em casa se puder.
- Usar máscaras em lojas, transportes públicos e quando for difícil ficar longe de outras pessoas - principalmente em ambientes fechados, em locais aglomerados.
- Evitar o contato com pessoas com maior risco de doença grave por covid-19.

² <https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-and-treatment/how-long-to-self-isolate/>

RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO DE CASOS POR COVID-19 BRASIL



PACIENTES IMUNOCOMPETENTES COM SG POR COVID-19 (QUADROS LEVES OU MODERADOS)

| Tempo | Isolamento de 5 dias | | Isolamento de 7 dias | Isolamento de 10 dias | | |
|---------------------|--|---|---|--|---|--|
| | SEM SINTOMAS | | SEM SINTOMAS | COM SINTOMAS | | SEM SINTOMAS |
| Condição de saúde | Ao 5º dia completo, se o caso estiver SEM sintomas respiratórios E sem febre E sem uso de medicamentos antitérmicos E há pelo menos 24 horas. | | Ao 7º dia, se o caso estiver SEM sintomas respiratórios E sem febre E sem uso de medicamentos antitérmicos E há pelo menos 24 horas. | Ao 7º dia, se estiver COM sintomas respiratórios ou febre | | Ao 10º dia, se o caso estiver SEM sintomas respiratórios E sem febre E sem uso de medicamentos antitérmicos E há pelo menos 24 horas. |
| Teste | Com testagem no 5º dia com RT-PCR ou TR-Ag | | Não é necessário testar para sair do isolamento | Com testagem no 7º dia com RT-PCR ou TR-Ag | | Não é necessário testar para sair do isolamento |
| Resultado | Resultado Negativo | Resultado positivo | x | Resultado negativo | Resultado positivo | x |
| Saída do isolamento | Sair do isolamento após 5 dias completos e manter as recomendações adicionais até o 10º dia | Manter o isolamento até 10 dias completos | Sair do isolamento após 7 dias completos e manter as recomendações adicionais até o 10º dia | Sair do isolamento se o caso estiver SEM sintomas respiratórios E sem febre E sem uso de medicamentos antitérmicos após 24 horas. | Manter o isolamento até o 10º dia. Sair do isolamento se o caso estiver SEM sintomas respiratórios E sem febre E sem uso de medicamentos antitérmicos após 24 horas. | Sair do isolamento no 10º dia e manter as medidas não farmacológicas |



MINISTÉRIO DA SAÚDE

